

## お問い合わせ先

医療法人社団T I K 大手町さくらクリニック in 豊洲

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-20  
豊洲フロント2F


TEL: 03-6219-5688

FAX: 03-6219-5689

<http://oscl.jp/>

## アクセス

東京メトロ有楽町線「豊洲」駅  
1C出口より徒歩3分



# 海外渡航者向 ワクチン接種のご案内

医療法人社団T I K 大手町さくらクリニック in 豊洲

## 海外渡航と予防接種

海外渡航時には国内旅行とは異なり、日本ではあまり見られない感染症にかかる危険性があります。そこで自分自身が感染することを予防するとともに、家族や周囲の人達への感染を防止するために、事前の予防接種をお奨めします。

また、黄熱病のように入国時に予防接種済みの証明書を要求する国や地域があることなどから、渡航先、滞在地におけるリスク状況などの情報も正確に把握してから出発しましょう。

麻疹、風疹などは罹患歴と抗体検査で、接種の有無を決めさせていただいています。

接種方法は一種類のワクチンでも数回(2~3回)、期間をあけて接種する必要があるものもありますから、ワクチン接種は余裕(できるだけ出発3ヵ月以上前から)をもって早めに計画しましょう。

なお、当院は16歳以上の方を対象としております。乳幼児には対応していませんので、ご了承ください。

### 【接種回数と有効期間】

|      | ワクチンの種類 | 抗体獲得率       | 接種回数 | 基礎免疫の接種間隔 |             | 有効期間<br>(追加接種の目安) |
|------|---------|-------------|------|-----------|-------------|-------------------|
|      |         |             |      | 2回目       | 3回目         |                   |
| A型肝炎 | 不活化     | 2回でほぼ100%   | 3回   | 2~4週      | 2回目の6ヵ月後    | 5~10年             |
| B型肝炎 | 不活化     | 3回で70~90%   | 3回   | 4週間       | 2回目の6ヵ月後    | 10年               |
| 破傷風  | トキソイド   | 2回でほぼ100%   | 3回   | 4週間       | 2回目の12ヵ月後   | 10年               |
| 狂犬病  | 不活化     | 3回でほぼ100%   | 3回   | 4週間       | 2回目の6ヵ月後    | 5年                |
| 腸チフス | Viワクチン  | (注射)1回60%以上 | 1回   |           |             | 3年                |
| 日本脳炎 | 不活化     | 2回で80%      | 1回   |           |             | 4年                |
| 髄膜炎菌 | 精製抗原    |             | 1回   |           |             | 3~5年              |
| ポリオ  | 不活化     | 3回でほぼ100%   | 3回   | 1~2ヵ月     | 2回目の6~12ヵ月後 | 5年以上              |
| ダニ脳炎 | 不活化     | 3回でほぼ100%   | 3回   | 4週間       | 2回目の12ヵ月後   | 3年                |
| 黄熱   | 生ワクチン   | 1回でほぼ100%   | 1回   | ※検疫所で接種   |             | 10年               |

※接種回数は滞在期間・場所によって異なります。

※破傷風ワクチン:1968年以降に生まれた方で既に小児期に接種済みの方は1回の追加接種のみ

海外渡航で検討する予防接種の種類の日安

| 地域及び滞在期間 | 黄熱 | ポリオ | 麻疹及び風しん※1 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 |
|----------|----|-----|-----------|------|------|------|-----|-----|
| 東アジア     | 短期 |     | ◎         |      | ○    |      |     |     |
|          | 長期 |     | ◎         | ○    | ◎    | ○    | ○   | ◎   |
| 東南アジア    | 短期 |     | ◎         |      | ○    |      |     |     |
|          | 長期 |     | ◎         | ○    | ◎    | ○    | ○   | ◎   |
| 南アジア     | 短期 |     | ◎         |      | ○    |      |     |     |
|          | 長期 | ○   | ◎         | ○    | ◎    | ○    | ○   | ◎   |
| 中近東      | 短期 |     | ◎         |      | ○    |      |     |     |
|          | 長期 | ○   | ◎         |      | ◎    | ○    | ○   | ◎   |
| 太平洋地域    | 短期 |     | ◎         |      | ○    |      |     |     |
|          | 長期 |     | ◎         |      | ○    | ○    | ○   | ◎   |
| オセアニア    | 短期 |     | ◎         |      |      |      |     |     |
|          | 長期 |     | ◎         |      |      |      |     | ◎   |
| 北アフリカ    | 短期 |     | ◎         |      | ○    |      |     |     |
|          | 長期 | ○   | ◎         |      | ◎    | ○    | ○   | ◎   |
| 中央アフリカ   | 短期 | ●   | ◎         |      | ○    |      |     |     |
|          | 長期 | ●   | ◎         |      | ◎    | ○    | ○   | ◎   |
| 南アフリカ    | 短期 |     | ◎         |      | ○    |      |     |     |
|          | 長期 | ○   | ◎         |      | ◎    | ○    | ○   | ◎   |
| 北・西ヨーロッパ | 短期 |     | ◎         |      |      |      |     |     |
|          | 長期 |     | ◎         |      |      |      | ○※2 | ◎   |
| 東ヨーロッパ   | 短期 |     | ◎         |      |      |      |     |     |
|          | 長期 | ○   | ◎         |      | ○    | ○    | ○   | ◎   |
| 南ヨーロッパ   | 短期 |     | ◎         |      |      |      |     |     |
|          | 長期 |     | ◎         |      | ○    | ○    | ○   | ◎   |
| ロシア      | 短期 |     | ◎         |      |      |      |     |     |
|          | 長期 |     | ◎         |      | ○    | ○    | ○   | ◎   |
| 北米       | 短期 |     | ◎         |      |      |      |     |     |
|          | 長期 |     | ◎         |      |      |      | ○   | ◎   |
| 中南米      | 短期 | ●   | ◎         |      | ○    |      |     |     |
|          | 長期 | ●   | ◎         |      | ◎    | ○    | ○   | ◎   |

●: 黄熱に感染するリスクがある地域

◎: 予防接種をおすすめしています

○: 局地的な発生があるなど、リスクがある場合に接種を検討してください

※1: 今までに2回接種の既往がない方、もしくは接種既往が不明の方に予防接種をおすすめしています。麻疹もしくは風しんの予防接種には、麻疹風しん混合ワクチン(MRワクチン)の使用が推奨されます。妊娠期間中は予防接種を受けられません。

麻疹・風しんについての詳しい情報は厚生労働省からの情報もしくはWHOのホームページをご参照下さい。

※2: アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェーと英国の一部は狂犬病清浄地域とされています。

## 料金(税込み)

■ 診察料(初回のみ) 2,200 円

■ ワクチン料金(1回につき)

| 種類                    | 接種料(税込み) |
|-----------------------|----------|
| A型肝炎ワクチン(エイムゲン)       | 8,800 円  |
| A型肝炎ワクチン(Havrix)      | 16,500 円 |
| B型肝炎ワクチン(ヘプタボックス)     | 6,050 円  |
| A+B 肝炎ワクチン(Twinrix)   | 17,600 円 |
| 狂犬病ワクチン(Verorab)      | 17,600 円 |
| 破傷風トキソイド              | 3,300 円  |
| DPT (ジフテリア、百日咳、破傷風)   | 4,180 円  |
| T-dap (ジフテリア、百日咳、破傷風) | 17,600 円 |
| DPT-IP (DPT,ポリオ)      | 13,200 円 |
| 腸チフスワクチン              | 13,200 円 |
| 日本脳炎                  | 6,600 円  |
| ダニ脳炎                  | 19,800 円 |
| ポリオ                   | 9,900 円  |
| 髄膜炎菌(メンクアッドフィ)        | 22,000 円 |
| 髄膜炎菌 B(Bexsero)       | 37,400 円 |
| MMR(Priorix)          | 15,400 円 |
| コレラ                   | 37,400 円 |

■ 自費薬

|                   |    |         |
|-------------------|----|---------|
| メファキン(マラリア治療・予防薬) | 1錠 | 1,760 円 |
| マラロン(マラリア治療・予防薬)  | 1錠 | 1,100 円 |
| ダイアモックス(高山病予防薬)   | 1錠 | 670 円   |

## 予約方法

月・水・金の12:00~13:00 予約制となります。

1回目接種希望日の1週間前までに、お電話にてご予約下さい。

TEL:03-6219-5688

## 接種時の注意事項

■ 次の方は予防接種を受けることができません。

1. 明らかに発熱のある方(37.5℃以上)
2. 重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
3. 今日受ける予防接種、または予防接種に含まれる成分によって、アナフィラキシー(接種後30分以内に出現する急性のアレルギー反応のことで、蕁麻疹・呼吸困難・ショック状態)を起こしたことのある方
4. 医師が接種不相当と判断した場合

■ 次の方は予防接種を受ける前に医師にご相談ください。

1. 心疾患、肝疾患、腎疾患、神経疾患、血液疾患、発育障害、その他の慢性疾患等で治療を受けている方
2. 以前に予防接種を受けたとき、2日以内に発熱・発疹・蕁麻疹などのアレルギーを疑う症状がみられた方
3. 薬、食品に対してアレルギーのある方
4. 妊娠または妊娠の可能性のある方

■ 接種後のお願い

接種後15分間は、クリニックにて経過観察をさせていただきます。

## ワクチン接種についての注意事項

◎ 破傷風トキソイドについて

小児期にDPT3種混合ワクチン接種を受けていない人(1968年以前に生まれた人)  
⇒ 2回目、3回目が必要

小児期にDPT3種混合ワクチン接種を受けた人  
⇒ 出発前に1回接種(10年間有効)

◎ ポリオについて

昭和50年~52年生まれの人は、小児期のポリオワクチン接種の効果が低かったため、追加接種を強くお奨めします。

◎ 黄熱ワクチンについて

初回ワクチン接種から5週間後に検疫所での接種が可能です。  
黄熱ワクチン接種後4週間は、他のワクチンを接種することはできません。  
渡航10日前までに接種が必要です。

## 【出発まで時間がない場合】

- 接種ワクチン（以下のワクチンから必要なものだけを接種）

| 1回目   | 2回目   | 3回目(3週後 or4週後)                                  |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| 初日  | 1週後   | 3週後   | 4週後                              |
| A型肝炎(Havrix)<br>DPT/Tdap<br>日本脳炎①<br>A+B型肝炎(Twinrix)<br>狂犬病(Verorab)<br>ダニ脳炎<br>ポリオ | 腸チフス<br>A+B型肝炎(Twinrix)<br>狂犬病(Verorab)<br>ダニ脳炎 | 髄膜炎、<br>A+B型肝炎(Twinrix)<br>狂犬病(Verorab)<br>ダニ脳炎 | (破傷風トキソイド)<br>(日本脳炎②)<br><br>ポリオ |

## 【アジア、アフリカ、中南米に短期滞在 ないし 旅行する場合】

- 接種ワクチン

A型肝炎ワクチン(エイムゲン)を2～3回、or A型肝炎ワクチン(Havrix)を1回  
破傷風トキソイドを1～3回

| 1回目                          | 2回目                  | 3回目      |           |
|------------------------------|----------------------|----------|-----------|
| 初日                           | 2～4週後                | 2回目の6ヶ月後 | 2回目の12ヶ月後 |
| エイムゲン①<br>Havrix<br>DPT/Tdap | エイムゲン②<br>(破傷風トキソイド) | エイムゲン③   | (DPT)     |

## 【アジアに長期間滞在する場合】

※長期とは、概ね1ヶ月以上滞在の場合

- 接種ワクチン

A型肝炎ワクチン、B型肝炎ワクチン、狂犬病ワクチンをそれぞれ2～3回、破傷風トキソイドを1～3回、日本脳炎ワクチン、腸チフスワクチンを各1回。1975年～1977年生まれの方は渡航先によってはポリオワクチン接種が1回必要になります。

| 1回目  |      | 2回目  | 3回目                    |           |
|--|------|--|------------------------|-----------|
| 初日   | 2週後  | 4週後  | 2回目の6ヶ月後               | 2回目の12ヶ月後 |
| A型肝炎①<br>B型肝炎①<br>狂犬病①<br>日本脳炎①<br>DPT/Tdap<br>(ポリオ) | 腸チフス | A型肝炎②<br>B型肝炎②<br>狂犬病②<br>(日本脳炎②)<br>(破傷風トキソイド)<br>(ポリオ) | A型肝炎③<br>B型肝炎③<br>狂犬病③ | (DPT)     |

## 【アフリカ、特に赤道アフリカに長期間滞在する場合】

※長期とは、概ね1ヶ月以上滞在の場合

- 接種ワクチン

黄熱ワクチンは検疫所での接種となります。

1975年～1977年生まれの方は渡航先によってはポリオワクチン接種が1回必要になります。

| 1回目   |              | 2回目   | 3回目                    |           |
|---|--------------|---|------------------------|-----------|
| 初日  | 2週後          | 4週後   | 2回目の6ヶ月後               | 2回目の12ヶ月後 |
| A型肝炎①<br>B型肝炎①<br>狂犬病①<br>DPT/Tdap<br>(ポリオ) | 腸チフス<br>髄膜炎菌 | A型肝炎②<br>B型肝炎②<br>狂犬病②<br>(破傷風トキソイド)<br>(ポリオ) | A型肝炎③<br>B型肝炎③<br>狂犬病③ | (DPT)     |

## 【中南米に長期間滞在する場合】

※長期とは、概ね1ヶ月以上滞在の場合

- 接種ワクチン（以下のワクチンから必要なものだけを接種）

| 1回目   |      | 2回目   | 3回目                    |           |
|---|------|---|------------------------|-----------|
| 初日  | 2週後  | 4週後   | 2回目の6ヶ月後               | 2回目の12ヶ月後 |
| A型肝炎①<br>B型肝炎①<br>狂犬病①<br>DPT/Tdap<br>(ポリオ) | 腸チフス | A型肝炎②<br>B型肝炎②<br>狂犬病②<br>(破傷風トキソイド)<br>(ポリオ) | A型肝炎③<br>B型肝炎③<br>狂犬病③ | (DPT)     |

## 【ロシア・東ヨーロッパに長期間滞在する場合】

- 接種ワクチン（以下もワクチンから必要なものだけを接種）

| 1回目  |     | 2回目  | 3回目                    |               |
|--|-----|--|------------------------|---------------|
| 初日   | 2週後 | 4週後  | 2回目の6ヶ月後               | 2回目の12ヶ月後     |
| A型肝炎①<br>B型肝炎①<br>狂犬病①<br>DPT/Tdap<br>ダニ脳炎 |     | A型肝炎②<br>B型肝炎②<br>狂犬病②<br>(破傷風トキソイド)<br>ダニ脳炎 | A型肝炎③<br>B型肝炎③<br>狂犬病③ | (DPT)<br>ダニ脳炎 |